

COLÍRIO ALMEIDA PRADO

MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:

SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL - Frasco plástico opaco gotejador com 20 ml

VIA DE ADMINISTRAÇÃO: USO TÓPICO OCULAR

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO - Cada ml contém: Magnesia carbonica 5CH 0,0033 ml, Calendula officinalis 3CH 0,0033 ml, Euphrasia officinalis 3CH 0,0034 ml. Veículo qsp 1,00 ml.

Veículo: Borato de sódio, Cloreto de sódio, Ácido bórico e Água purificada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é utilizado como auxiliar no tratamento dos sintomas das irritações oculares.

A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

É destinado ao tratamento das irritações nos olhos causadas por poeira, vento, calor, fumaça, gases irritantes, luz e corpos estranhos, diminuindo a vermelhidão e aliviando as irritações nos olhos.

A chegada do calor faz com que tenhamos que aumentar o cuidado com os olhos. Ar condicionado, vento, poeira, poluição, fumaça, água do mar, areia da praia, cosméticos, entre outros, podem provocar irritações. O Colírio Almeida Prado pode ser empregado para a limpeza diária dos seus olhos. Manter seu olho limpo auxilia a fechar a porta de entrada para conjuntivites.

Pode ser utilizado diariamente.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Este produto está de acordo com o princípio da Homeopatia, que afirma que as substâncias capazes de desenvolver sintomas em indivíduos sadios através da experimentação, são utilizadas em doses homeopáticas para a ação esperada do medicamento que é: auxiliar no tratamento dos sintomas das irritações oculares.

As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Quando o paciente for hipersensível aos componentes da fórmula.

NÃO PODERÁ SER APLICADO EM GRANDES ÁREAS DO CORPO, QUANDO EXISTIREM LESÕES DE QUALQUER TIPO, FERIDAS OU QUEIMADURAS. PRODUTO DE USO EXCLUSIVO EM ADULTOS. O USO EM CRIANÇAS REPRESENTA RISCO À SAÚDE.

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Informe ao seu prescritor sobre a gravidez durante o tratamento ou após o seu término. Informe ao seu prescritor se estiver amamentando. **Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

O prazo de validade deste medicamento é de 24 meses a partir da data de fabricação (vide embalagem), desde que seja conservado lacrado em local fresco, seco e ao abrigo da luz.

O Colírio permanece estéril até que o lacre seja rompido.

Manter o medicamento em temperatura ambiente (15°C a 30°C).

Para evitar contaminação, não toque o gotejador em nenhuma superfície. Fechar a embalagem adequadamente logo após o uso. Após aberto válido por 28 dias.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Guarde-o em sua embalagem original.

A solução ocular é transparente. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de microondas, aparelho celular, televisão, etc.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Posologia sugerida: Adultos – instilar 2 gotas no olho afetado, 3 vezes ao dia.

1.Recline a cabeça para trás com os olhos fechados, aproxime o gotejador no canto do olho;
2.Aperte levemente o frasco plástico, para gotejar o produto. Abra e feche os olhos duas ou três vezes. Se a irritação persistir ou se sentir dores nos olhos ou alteração na visão, consulte o médico. Evite tocar a ponta do frasco nos olhos.

Remover as lentes de contato antes de utilizar o colírio.

Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula.

Na Homeopatia, a melhora dos sintomas é reacional, progressiva e geralmente observada em até 30 dias de tratamento na dosagem sugerida. Em caso de doenças crônicas a melhora dos sintomas pode ser observada acima de 30 dias de tratamento.

Não desaparecendo os sintomas em até 30 dias, consulte um profissional de saúde.

No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.

Não é necessário acordar à noite para utilizar o medicamento homeopático.

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias pode envolver risco e devem estar sob a responsabilidade do prescritor.

Não se automedique, pode ser prejudicial à saúde e dificultar o diagnóstico correto do médico.

Siga corretamente o modo de usar.

Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico.

Não desaparecendo os sintomas, procure a orientação do seu médico ou cirurgião-dentista.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.

Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento.

Siga corretamente suas orientações.

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista. Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Não são relatados e conhecidos males e limitações de uso dos medicamentos homeopáticos.

Não foram realizados estudos em animais e nem em mulheres grávidas.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do Serviço de Atendimento. Em caso de sintomas que causem mal estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

A melhor conduta nesta situação é a espera e observação. Aumente a ingestão de líquidos.

Caso ocorram vômitos ou enjoos, procure ajuda emergencial médica.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme RDC nº 721/2022.

Nº do lote, data da fabricação e data da validade: vide embalagem.

Notificado e produzido por Farmácia e Laboratório Homeopático **ALMEIDA PRADO** Ltda.

Praça Benedito Calixto 129/133 - São Paulo - SP

CNPJ 60.862.208/0001-41

Farmacêutica Responsável: Dra. Zuleika Carvalho - CRF/SP 4.142

SAC 08000 11 55 41

